

JULI

Juli is voor veel van ons kwekers de vakantiemaand, wat wil zeggen dat het gewone leven wat lossier en ontspannen is. Daarin schuilt een zeker gevaar voor onze vogels want de regelmatige verzorging loopt nu soms mank. Tijdens de vakantie wordt er meer aan ontspanning gedacht en zodus komt onze hobby al eens op de tweede plaats. Dat is natuurlijk niet goed te keuren. Ik denk bvb. aan laattijdig of te weinig voeren, het voer te lang laten staan of laattijdig willen ringen enz... Voor diegenen die met vakantie willen is het van het grootste belang een goede verzorger te hebben, want in deze periode gebeuren er nog veel narigheden in onze kweekruimten. Op dit moment is het gevaar voor bacteriële infecties groot. Het warme weer zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Hierbij denk ik aan colibacillose (zweetziekte). Deze ziekte treedt vooral op bij jonge nestvogels van 3 à 4 dagen. Ze hebben dunne, geelbruine ontlasting waarmee ze het nest besmeuren. In dit stadium kan nog ingegrepen worden maar meestal is het te laat. Wanneer ik vermoedens heb dat bepaalde koppels gevoelig zijn voor deze ziekte (uit vorige nesten) geef ik 4 dagen voor het kippen sigmamyne (1 gr./l. water) en houd ik dit aan tot ze 6 dagen oud zijn. Volgens mij een goede methode om deze ziekte te overwinnen, die nog altijd een oorzaak is van veel sterfte onder de jonge vogels. Vanaf nu worden de oudste zelfstandige jongen al eens gekuurd met ESB3 30%. Drie dagen medicijn in het drinkwater, dan twee dagen zuiver water en tot slot nog eens 3 dagen medicijn in het drinkwater. Hierbij moeten we denken aan de gevoelige soorten: groenvink, putter, goudvink... Ook zien we op het einde van deze maand dat de rui bij overjarige vogels reeds begonnen is. Dus moeten we opletten met diegenen welke de roodfactor bezitten. Willen we ze gebruiken voor de TT dan zal wat kleurstof aan de voeding of het drinkwater toegevoegd worden. Op het einde van deze maand is het de hoogste tijd voor de laatste nesten. Wie in juli nog eieren heeft mag verder doen, de rest mag stoppen want latere broedsels zijn meestal mislukkingen. In de natuur zijn er reeds verschillende onkruiden in zaad bvb. de moerasspirea, zeer geliefd door oude en jonge vogels.